

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу

### ГЕДЕРИН

#### **Склад:**

*діюча речовина:* сухий екстракт плюща листя;

1 капсула містить сухого екстракту плюща листя (*Hedera helix L., folium extractum siccum*) [(4–8) : 1] (екстрагент — етанол 30 %) при вмісті гедеракозиду С 14 % — 52,5 мг;

*допоміжні речовини:* мікрокристалічна целюлоза, лактози моногідрат, магнію стеарат.

Склад капсули твердої желатинової: желатин, титану діоксид (Е 171), заліза оксид (Е 172), індиготин (Е 132), синій патентований V (Е 131).

#### **Лікарська форма.** Капсули.

*Основні фізико-хімічні властивості:* тверді желатинові капсули салатого кольору із зеленими кришками, що містять порошок від світло-коричневого до темно-коричневого кольору з видимими темними частками.

#### **Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Відхаркувальні засоби.

Код АТХ R05C A12.

#### **Фармакологічні властивості.**

##### *Фармакодинаміка.*

Лікарський засіб рослинного походження. До його складу входить сухий екстракт листя плюща, який чинить протикашльову, відхаркувальну, спазмолітичну, протизапальну, антимікробну дію, зумовлену наявністю глікозидів (сапонінів). Зменшує в'язкість мокротиння, полегшує його відходження.

##### *Фармакокінетика.*

Не вивчалась.

#### **Клінічні характеристики.**

##### **Показання.**

Гострі запальні захворювання дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем. Хронічні запальні захворювання бронхів — симптоматичне лікування.

##### **Протипоказання.**

Підвищена чутливість до будь-якого компонента лікарського засобу або інших рослин родини аралієвих.

##### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні препарату з іншими лікарськими засобами небажаної дії препарату не спостерігалось. Тому препарат можна застосовувати з іншими лікарськими засобами, наприклад з антибіотиками.

##### **Особливості застосування.**

Якщо симптоми захворювання не зникають або якщо з'являється задишка, підвищення температури тіла, гнійне мокротиння або мокротиння з кров'ю, слід негайно проконсультуватися з лікарем. Не рекомендується одночасне застосування з протикашльовими препаратами, наприклад з кодеїном або декстрометорфаном. З обережністю застосовувати пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка.

Лікарський засіб містить лактозу, тому якщо у пацієнта встановлено непереносимість деяких цукрів, йому слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Через відсутність достатніх даних не рекомендується застосовувати лікарський засіб у періоди вагітності або годування груддю.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні автомобілем та іншими механізмами.

***Спосіб застосування та дози.***

Дорослим та дітям від 12 років — по 1 капсулі 2–3 рази на добу. Тривалість курсу лікування визначається лікарем індивідуально та залежить від тяжкості та перебігу захворювання. У легких випадках тривалість лікування становить 7 днів. Для досягнення стійкого терапевтичного ефекту рекомендується продовжувати терапію ще 2–3 доби після поліпшення стану пацієнта.

Якщо покращення стану пацієнта не настає, слід звернутися до лікаря щодо подальшого лікування.

***Діти.***

Лікарський засіб не застосовують дітям віком до 12 років.

***Передозування.***

Прийом доз, що перевищують рекомендовані, може викликати нудоту, блювання, діарею або збудження. Лікування симптоматичне.

***Побічні реакції.***

У пацієнтів із підвищеною чутливістю можуть спостерігатися: алергічні реакції (переважно висипання), включаючи диспное, набряк слизових оболонок, кропив'янку, свербіж, купероз; шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання, діарею, біль у животі. У разі появи будь-яких побічних реакцій слід припинити лікування та звернутися за консультацією до лікаря.

***Термін придатності.*** 3 років.

***Умови зберігання.***

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

***Упаковка.***

По 10 капсул у блістері, по 2 або по 3 блістери у коробці.

***Категорія відпуску.*** Без рецепта.

***Виробник.***

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

***Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.***

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.